

# Mefloquina 250 mg



## **PAUTA**

Un día a la semana tomará la dosis ajustada a su peso y edad en comprimido/s después del desayuno. Si tiene dificultad para tragarlos, puede triturarlos y disolverlos en agua o leche.

Esta pauta debe empezarla 1 ó 2 semanas antes de ir a la zona de riesgo, durante la estancia en dicha zona y 4 semanas después.

## **NOMBRES COMERCIALES**

Lariam®

## **EFFECTOS ADVERSOS**

- Evite tomar drogas euforizantes, estimulantes, alucinógenos (Alcohol, cannabis, cocaína, LSD, etc.) mientras tome este medicamento.
- Pueden aparecer molestias gastrointestinales (náuseas o diarrea).
- Si nota cambios en su visión o pérdida de equilibrio, consúltelo a su médico.
- No tome este medicamento sin toma otros para el corazón, circulación de la sangre, antidiabéticos orales, sedantes, anticonvulsivantes, sin haberlo consultado antes con su médico.
- Evite el embarazo mientras tome el medicamento y en los 3 meses posteriores.



## **NOTA**

Este medicamento no está comercializado en España y no se vende en las farmacias.

Se dispensará en medicamentos Extranjeros: C/ Recoletos 1 . Metro Colon

**RECUERDE SIEMPRE**

**Ante cualquier duda sobre la medicación consulte a su médico.**

